

# Informace pro nemocné léčené azathioprinem

Azathioprin (Imuran, Azaprine) je vysoce účinný lék k potlačování chorob z autoimunity, mezi které patří myastenie gravis a polymyositida. Léčba azathioprinem ale vyžaduje velmi dobrou spolupráci mezi pacientem a lékařem. Při dobré spolupráci se jedná o terapii velmi bezpečnou.

## Jak azathioprin působí?

Azathioprin potlačuje abnormální odpovědi imunitního systému, tím že potlačuje tvorbu a funkci bílých krvinek.

## Zahájení léčby

Někteří pacienti snáší terapii azathioprinem hůře, proto zahajujeme velmi malými dávkami. Pokud se objeví některé z následujících vedlejších příznaků, informujte okamžitě ošetřujícího lékaře:

- horečka
- vyrážka
- chřipkové příznaky
- zažívací potíže, zvracení, nevolnost.

## Nastavení správné dávky

Nastavení správné dávky vyžaduje pravidelné kontroly klinického stavu a krevního obrazu. Tyto kontroly je nutné provádět v intervalech, které stanoví váš ošetřující lékař: zpočátku zpravidla jednou týdně až 1x za 14 dnů, později se intervaly prodlužují na 3- 4 týdny. **Pravidelné kontroly a dobrá spolupráce mezi lékařem a pacientem jsou základní podmínkou terapie azathioprinem a předpokladem bezpečné léčby.**

## Možné vedlejší účinky:

1. Nevolnost a zažívací potíže.
2. Krvácení z dásní.
3. Různá plísňová onemocnění.
4. Větší náchylnost k infekčním onemocněním.

Lék je možné brát v jedné denní dávce. Pokud se dostaví zažívací potíže, je nutné rozdělit na tři denní dávky.

O Vaší chorobě a léčení informujte každého lékaře, kterého navštívíte se sebezbanálnější chorobou. Bezpodmínečně by o této terapii měl být informován Váš ošetřující praktický lékař.

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte ošetřujícího lékaře.